
Alcool et médecine générale. Recommandations cliniques pour le repérage précoce et les interventions brèves.

Les recommandations de cet ouvrage ont été élaborées au niveau européen. Elles font partie du projet PHEPA (Primary Health Care European Project on Alcohol), qui a rassemblé dix-sept états européens Traduit de l'anglais et adapté au contexte français par l'INCa. 141 p.

Pour voir la version originale du document : <a href="

<http://www.phepa.net/units/phepa/html/en/dir361/doc13210.html> ^[1] target="_blank">

<http://www.phepa.net/units/phepa/html/en/dir361/doc13210.html> ^[2]

Thème:

Europe - alcool ^[3]

Date du document:

Lundi Décembre 1 2008

Visibilité du contenu de groupe:

Use group defaults

Résumé:

Ces recommandations ne constituent pas un manuel de traitement de l'alcoolodépendance. Cependant, elles décrivent brièvement l'alcoolodépendance et ses modalités de prise en charge afin que les médecins généralistes sachent à quoi s'attendre lorsqu'ils adressent des patients difficiles vers un service spécialisé.

Auteur(s):

P. Anderson, A.Gual, J.Colom, INCa (trad.)

Lien(s) utile(s)

- <http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1146.pdf> ^[4]

[Retour à la base documentaire](#) ^[5]
